

Zahájení očkování

V 6 týdnech

Nepovinné

proti rotavirové střevní infekci (ROTATEQ, ROTARIX): podle typu vakcíny ve 2 nebo 3 dávkách v měsíčních intervalech. Podání ústy. Není hrazeno státem.

V 9 týdnech

Povinné

HEXACIMA Vakcínu očkujeme ve schématu 2+1. **PLNĚ HRAZENA STÁTEM - BEZ DOPLATKU**
Pozn. pro nedonošené děti (36+6 a méně) **INFANRIX HEXA** - platí celkem 4 dávky (první tři jsou měsíčním odstupem a čtvrtá je v prvním roce života). **PLNĚ HRAZENA STÁTEM - BEZ DOPLATKU**

Nepovinné

Prevenar 13 - (13 sérotypů) s doplatkem

SYNFLORIX - (10 serotypů) bez doplatku

V 15. měsíci

Povinné

Priorix - spalničky, příušnice, zarděnky

V 5. roce

Povinné

Adacel - záškrt, tetanus, černý kašel

Priorix - spalničky, příušnice, zarděnky - přeočkování

V 10. roce

Povinné

Boostrix Polio - záškrt, dětská mozková obrna, černý kašel, tetanus - 1 dávka

Další nepovinná očkování

1. Meningokok typu A, C, W, Y – **NIMENRIX** - od 6 až 12 týdnů 3 dávky, mezi první a druhou dávkou jsou 2 měsíce, třetí dávka ve 12 měsících věku

- od 12 měsíců věku, dospívající a dospělí - podává se jedna dávka

- **MENVEO** - od 2 let, dospívající a dospělí - podává se jedna dávka

- u MenA,C,W,Y vakcín se doporučuje přeočkování v pětiletých intervalech v případě přetrvávání rizika IMO,

2. Meningokok skupiny B – **BEXSERO** – od 2. -5. měsíců 4 dávky, od 6 měsíců do 2 let 3 dávky, od 2 let výše pouze 2 dávky

- **TRUMENBA** - od 10 let věku

3. Pneumokoky - PREVENAR 13 – od 7. - 11. měsíců dvě dávky s intervalem 1 měsíc mezi dávkami, třetí dávka se doporučuje podat ve druhém roce života.

- od 12.–23. měsíců dvě dávky s intervalem nejméně 2 měsíce mezi dávkami.

- od 2 – 17 let jedna dávka

4. Žloutenka typu A -

Havrix 720, Vaqta Pediatric – 2 dávky (Havrix 720 od 1 roku do 15 let včetně, Vaqta pediatric od 1 roku do 17 let včetně)

Havrix 1440, Vaqta Adult – 2 dávky

5. HPV –

Cervarix – 2 dávky, mezi 13.-14. rokem hradí pojišťovna , od 14 let 3 dávky za plnou cenu

Silgard – od 9. - 13. let života 2 dávky, mezi 13. - 14. rokem s pouze s doplatkem - velkou část hradí pojišťovna, od 14 let 3 dávky za plnou cenu

Gardasil 9 – od 9. - 14. let života 2 dávky, mezi 13. - 14. let s pouze s doplatkem - velkou část hradí pojišťovna, od 15 let 3 dávky za plnou cenu

7. Klíšťová encefalitida

FSME-IMMUN 0,25 a Encepur pro děti – 3 dávky + přeočkování á 3-5 let (FSME 0,25 od 1. do 15 let, Encepur pro děti od 1 roku do 11 let včetně)

FSME-IMMUN 0,5 a Encepur pro dospělé - 3 dávky + přeočkování á 3-5 let

8. Sezonní chřipka Vaxigrip, Influvac – 1 dávka

***Očkovací látky pro nepovinné očkování nejsou hrazena státem.
Ceny závisí od distributora (na dotaz Vám ji vždy aktuálně
zjistíme). Zdravotní pojišťovny většinou finančně přispívají,
doporučujeme se informovat.***

Po každém očkování počkejte v čekárně lékaře po dobu 30 minut. Tento postup se doporučuje po aplikaci jakéhokoliv léčiva do svalu, do podkoží nebo do žíly. I když jsou okamžité alergické reakce po očkování extrémně vzácné, je nezbytné tento postup dodržet.

Pozn.: Pro bezbolestné očkování můžete svým dětem koupit EMLA krém (lokální anestetikum) - je bez receptu volně prodejný. Cena cca 700Kč. Doporučuji kůži potřít 1-1,5 hod před očkováním. Nejdříve se zeptejte sestřičky na místo očkování. Lze ho využít i před odběrem krve.